

УДК 598.12(470.43)

ЗМЕИ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: НОВЫЕ МЕСТА НАХОДОК

© 2016 А.Г. Бакиев¹, Р.А. Горелов¹, А.А. Клёнина¹,
М.К. Рыжов², Е.И. Соломайкин³

¹Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти (Россия)

²ОАО «Мордовэнерго», Мордовия, Чамзинский район, пос. Комсомольский (Россия)

³Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород (Россия)

Поступила 30.01.2015

Приводятся новые данные о находках трех видов змей – *Coronella austriaca*, *Vipera berus* и *V. renardi* – из Красной книги Самарской области (2009). Восточная степная гадюка в новых отмеченных пунктах представлена формой *V. r. bashkirovi*.

Ключевые слова: змеи, Красная книга Самарской области, *Vipera renardi bashkirovi*.

Bakiev A.G., Gorelov R.A., Klyonina A.A., Ryzhov M.K., Solomaykin E.I.
Snakes from the Red book of the Samara area: new places of finds. – New data about finds of three kinds of snakes – *Coronella austriaca*, *Vipera berus* and *V. renardi* – from the Red book of the Samara area (2009) are cited. East steppe viper in the new noted points is presented as *V. r. bashkirovi* form.

Key words: snakes, the Red book of the Samara area, *Vipera renardi bashkirovi*.

Самарскую область достоверно населяют змеи шести видов: уж обыкновенный *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758), уж водяной *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768), обыкновенная медянка *Coronella austriaca* Laurenti, 1768, узорчатый полоз *Elaphe dione* (Pallas, 1773), обыкновенная гадюка *Vipera berus* (Linnaeus, 1758) и восточная степная гадюка *V. renardi* (Christoph, 1861). В Красную книгу Самарской области (2009) включены все эти виды, кроме обыкновенного ужа.

В ходе экспедиционных исследований 2010-2015 гг. для трех красно-книжных видов – медянки, обыкновенной и степной гадюк – нами выявлены пункты обитания, которые не отмечены в областной Красной книге (рисунок).

Медянка обнаружена в нежилом пос. Красный Яр Камышлинского рай-

Бакиев Андрей Геннадьевич, кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник, herpetology@list.ru; Горелов Роман Андреевич, аспирант, gorelov.roman@mail.ru; Клёнина Анастасия Александровна, младший научный сотрудник, colubrida@yandex.ru; Рыжов Максим Константинович, кандидат биологических наук, инженер-программист, herpeto-volga@yandex.ru; Соломайкин Евгений Игоревич, студент, e7v4gen5iy@yandex.ru

она (пункт 3 на рисунке), где она синтопична с краснокнижной обыкновенной гадюкой, ранее известной отсюда (Красная книга..., 2009). Обыкновенная гадюка найдена по правому берегу р. Кондурча в Челно-Вершинском районе (пункт 1), в окрестностях пос. Красная Лопата Сергиевского района (пункт 2) и пос. Вулкан Красноярского района (пункт 6). Наибольший интерес представляют находки восточной степной гадюки в Сергиевском и Ставропольском районах Самарской области (пункты 4 и 5 соответственно).




Рис. Места находок змей в Самарской области
(пояснения в тексте)

Здесь, в окрестностях пос. Ягодное (Ставропольский район) и с. Ендурайкино (Сергиевский район), добыты восточные степные гадюки с признаками редкой формы, известной как гадюка Башкирова *V. r. bashkirovi* Garanin et al., 2004. Она отличается от номинативного подвида крупными размерами, частым проявлением меланизма, в среднем бóльшим количеством брюшных щитков, меньшим – подхвостовых, верхнегубных и нижнегубных. Данный подвида тяготеет к лесным биотопам, и в экологическом плане, по мнению авторов описания (Гаранин и др., 2004), представляет форму, близкую к обыкновенной гадюке. Выявленные пункты обитания гадюки Башкирова не обозначены ни в Красной книге Самарской области (2009), ни в нашей монографии о гадюках Волжского бассейна (Бакиев и др., 2015). За пределами Самарской области данный таксон известен лишь в Спасском районе Татарстана и в Сенгилеевском районе Ульяновской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бакиев А.Г., Гаранин В.И., Гелашвили Д.Б. и др. Гадюки (Reptilia: Serpentes: Viperidae: *Vipera*) Волжского бассейна. Часть 1. Тольятти: Кассандра, 2015. 234 с.

Гаранин В.И., Павлов А.В., Бакиев А.Г. Степная гадюка, или гадюка Ренарда *Vipera renardi* (Christoph, 1861) // Бакиев А.Г., Гаранин В.И., Литвинов Н.А., Павлов А.В., Ратников В.Ю. Змеи Волжско-Камского края. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2004. С. 61-90.

Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных. Тольятти: Кассандра, 2009. 332 с.